

# Differenciálegyenletek. II. rész.

## folytatás

2018. május 14.

# Inhomogén Lineáris DE

Lineáris differenciáloperátor:

$$L[y] = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y, \quad a_j = a_j(x), \quad j = 1, \dots, n.$$

INHOMOGÉN LDE:  $L[y] = f$ , ahol  $f$  adott függvény, azaz

$$y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_n(x)y(x) = f(x).$$

Tehát az  $L[y] = 0$  homogén egyenlet megoldásai ismertek.

Az  $n$  db lineárisan független megoldás  $y_1, \dots, y_n$ .

A HLDE általános megoldása:  $y = \sum_{k=1}^n c_k y_k$ ,  $c_k \in \mathbb{R}$ .

# Inhomogén LDE. $L[y] = f$

Tétel.

A LDE megoldásainak struktúrája:

1. Ha  $y_1$  a H LDE mo-a és  $y_2$  az IH LDE mo-a



$y_1 + y_2$  az inhomogén LDE mo-a

2. Ha  $y_1$  és  $y_2$  az inhomogén LDE mo-a



$y_1 - y_2$  a homogén LDE mo-a

# Állandók variálása módszer

Az IH egyetlen megoldását keressük:

$$y_p(x) = \gamma_1(x)y_1(x) + \cdots + \gamma_n(x)y_n(x), \text{ " } c_k \sim \gamma_k(x).$$

**Állítás.** Az alábbi feltételek esetén:

$$\gamma'_1 y_1 + \cdots + \gamma'_n y_n = 0$$

$$\gamma'_1 y'_1 + \cdots + \gamma'_n y'_n = 0$$

⋮

$$\gamma'_1 y_1^{(n-2)} + \cdots + \gamma'_n y_n^{(n-2)} = 0$$

$$\gamma'_1 y_1^{(n-1)} + \cdots + \gamma'_n y_n^{(n-1)} = f(x)$$

$y := \sum_{k=1}^n \gamma_k y_k$  valóban megoldás:  $L[y] = f$ .

# Állandók variálása módszer

Kompakt formában a feltételek:

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \dots & y'_n \\ \vdots & & & \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma'_1 \\ \gamma'_2 \\ \vdots \\ \gamma'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f \end{pmatrix}.$$

Baloldalon: Wronski-mátrix. Megoldható. ✓

BIZONYÍTÁS. Legyen  $y = \sum_{k=1}^n \gamma_k y_k$ . Deriváltja

$$y' = \sum_{k=1}^n \gamma'_k y_k + \sum_{k=1}^n \gamma_k y'_k = \sum_{k=1}^n \gamma_k y'_k.$$

Hasonlóan  $j < n$ -re:  $y^{(j)} = 0 + \sum_{k=1}^n \gamma_k y_k^{(j)}$ .

$$y^{(n)} = \sum_{k=1}^n \gamma'_k y_k^{(n-1)} + \sum_{k=1}^n \gamma_k y_k^{(n)} = f + \sum_{k=1}^n \gamma_k y_k^{(n)}.$$

Behelyettesítve,  $L[y] = \sum_{k=1}^n L[\gamma_k y_k]$ :

$$L[y] = f + \sum_{k=1}^n \gamma_k L[y_k] = f, \quad \text{u.i.} \quad L[y_k] = 0.$$

Speciálisan.  $y'' + a_1 y' + a_2 y = f.$

A HLDE alapmegoldásai:  $y_1, y_2$ .

Az IH partikuláris mo:  $y_p = \gamma_1 y_1 + \gamma_2 y_2$ ,  $\gamma_1(x) = \gamma_2(x) = ?$

A feltételek:

$$\gamma'_1 y_1 + \gamma'_2 y_2 = 0$$

$$\gamma'_1 y'_1 + \gamma'_2 y'_2 = f.$$

Így a megoldandó egyenletrendszer:

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \gamma'_1 \\ \gamma'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f \end{pmatrix}.$$

## Példa. Harmonikus rezgés.

$$y'' + y = \frac{1}{\cos(x)}, \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}.$$

1.) Homogén rész.

$$y'' + y = 0 \implies P(\lambda) = \lambda^2 + 1 \implies \lambda_{1,2} = \pm i.$$

$$\implies y_1 = \cos(x), \quad y_2 = \sin(x).$$

Homogén általános mo.  $y_h = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$ ,  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ .

2.) IH rész.  $y_p = \gamma_1 \cos(x) + \gamma_2 \sin(x)$ .  $\gamma_1 =?$   $\gamma_2 =?$

$$\begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \gamma'_1(x) \\ \gamma'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\cos(x)} \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \gamma'_1(x) \\ \gamma'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(x) & -\sin(x) \\ \sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\cos(x)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \gamma'_1(x) &= -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} &\Rightarrow \gamma_1(x) = \ln(\cos(x)) \\ \gamma'_2(x) &= 1 &\Rightarrow \gamma_2(x) = x. \end{aligned}$$

3.) Ált. mo.  $y_{alt}(x) = (\ln(\cos(x)) + c_1)\cos(x) + (x + c_2)\sin(x)$ .

# Próbafüggvények alkalmazása IH LDE megoldására

Állandó együtthatós IH LDE, melynek speciális a jobboldala, egyik partikuláris mo-a speciális alakú.

$$L[y] = y^{(n)}(x) + \textcolor{violet}{a}_1 y^{(n-1)}(x) + \dots + \textcolor{violet}{a}_n y(x) = f(x), \quad \textcolor{violet}{a}_j \in \mathbb{R}.$$

Néhány alapeset:

- Ha  $f(x) = K e^{\alpha x}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , akkor  $y(x) = A e^{\alpha x}$ ,  $A = ?$
- Ha  $f(x) = a_m x^m + \dots + a_0$ , akkor  $y(x) = A_m x^m + \dots + A_0$  alakú,  $A_0, \dots, A_m = ?$
- Ha  $f(x) = K \sin(\alpha x)$  vagy  $f(x) = K \cos(\alpha x)$ , akkor  $y(x) = A \sin(\alpha x) + B \cos(\alpha x)$  alakú,  $A = ?$  és  $B = ?$

Ha  $f(x)$  függvények összege, akkor a próbafüggvény is összeg.

## Kétdimenziós DER

Keresünk  $y(x)$  és  $z(x)$ , melyek kielégítenek egy DER-t:

$$y'(x) = f(x, y(x), z(x)) \quad (1)$$

$$z'(x) = g(x, y(x), z(x)), \quad (2)$$

ahol  $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  típusúak.

Tétel.

$T \subset \mathbb{R}^3$ , és  $(x_0, y_0, z_0) \in \text{int } T$ . Tízfürdő az  $f, g : T \rightarrow \mathbb{R}$  függvényekre

$$|f(x, y, z) - f(x, \bar{y}, \bar{z})| \leq M(|y - \bar{y}| + |z - \bar{z}|)$$

Ekkor az (1), (2) DER-nek tetszőleges  $y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0$  kezdetiértékkel  $\exists!$  megoldása.

## *n*-dimenziós DER

$$y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \quad y_1(x_0) = y_{10},$$

$$\vdots \qquad , \qquad \vdots$$

$$y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \quad y_n(x_0) = y_{n0}$$

Ismerős? Legyen  $y^{(3)} + a_1 y'' + a_2 y' + a_3 y = \phi(x)$ .

Rendeljük hozzá következő DER-t:

$$y_1(x) = y(x), \quad y_2(x) = y'(x), \quad y_3(x) = y''(x)$$

Az összefüggések:

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y_3$$

$$y'_3 = -a_1 y_3 - a_2 y_2 - a_3 y_1 + \phi.$$

## 3 dim. lineáris, állandó eühatós homogén. DER

$$\begin{aligned}y'_1 &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 & y_1(0) &= y_{01} \\y'_2 &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + a_{23}y_3 & y_2(0) &= y_{02} \\y'_3 &= a_{31}y_1 + a_{32}y_2 + a_{33}y_3, & y_3(0) &= y_{03}\end{aligned}$$

Kompakt alak:

$$Y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ y_3(x) \end{pmatrix}, \quad Y'(x) = \begin{pmatrix} y'_1(x) \\ y'_2(x) \\ y'_3(x) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

A DER így írható

$$Y'(x) = AY(x), \quad Y(0) = Y_0. \quad (3)$$

## Példa, folytatás

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y_3$$

$$y'_3 = -a_3 y_1 - a_2 y_2 - a_1 y_3 + \phi.$$

Az együttható-mátrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

Ez a DE KISÉRŐ MÁTRIXA (companion matrix).

$$Y'(x) = AY(x), \quad Y(0) = Y_0.$$

Tétel.

A lineáris DER megoldása:  $Y(x) = e^{Ax} Y_0$ .

Az  $e^A$  mátrix:  $e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ .

Pi. ha  $A$  szimmetrikus, akkor  $A = UDU^T$ , ahol

$$U^T U = UU^T = I, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Ekkor  $A^k = UDU^T \cdot UDU^T \cdots UDU^T = UD^k U^T$ ,

$$\implies e^A = Ue^D U^T, \quad \text{ahol} \quad e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3} \end{pmatrix}.$$

$$Y'(x) = AY(x)$$

Tétel.

*Tehát A sajátértékei különbözőek:  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ .*

*A megfelelő sajátvektorok  $s_1, s_2, s_3$ .*

*Ekkor a DER lineárisan független megoldás-rendszerre*

$$Y_k = e^{\lambda_k x} s_k, \quad k = 1, 2, 3.$$

*Továbbá  $\forall Y(0) = Y_0 \in \mathbb{R}^3$  kezdetiértékhez  $\exists! Y$  megoldás,*

*melyre:*

$$Y = c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + c_3 Y_3, \quad c_k \in \mathbb{R}.$$

## Bizonyítás.

1. ( $Y_k = e^{\lambda_k x} s_k$ ) lineárisan függetlenek:  $\lambda_i \neq \lambda_j$  és  $s_j \perp s_i$ .
2.  $Y_k = e^{\lambda_k x} s_k$  megoldás, u.i.

$$Y'_k(x) = \lambda_k e^{\lambda_k x} s_k,$$

$$AY_k(x) = Ae^{\lambda_k x} s_k = e^{\lambda_k x} As_k = e^{\lambda_k x} \lambda_k s_k.$$

$$\implies Y'_k(x) = AY_k(x).$$

*Megjegyzés.* A téTEL akkor is igaz, ha minden többszörös sajátértékhez lineárisan független sajátvektor-rendszer tartozik.